

## MASTER'S THESIS

### 肺癌放化療期間的中醫藥治療

任立新

*Date of Award:*  
2008

[Link to publication](#)

#### General rights

Copyright and intellectual property rights for the publications made accessible in HKBU Scholars are retained by the authors and/or other copyright owners. In addition to the restrictions prescribed by the Copyright Ordinance of Hong Kong, all users and readers must also observe the following terms of use:

- Users may download and print one copy of any publication from HKBU Scholars for the purpose of private study or research
- Users cannot further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- To share publications in HKBU Scholars with others, users are welcome to freely distribute the permanent URL assigned to the publication

# 肺癌放化療期間的中醫藥治療

任立新

06417558

中醫碩士學位課程

指導老師：焦智民教授

香港浸會大學

二零零零年六月

## 論文摘要

肺癌成爲世上對人類生命危害最大的病患之一，是因爲早期的肺癌基本上是不容易被察覺。許多病患者在症狀出現時或通過胸部 X 線檢查、磁共振、或電子計算機體層掃描等儀器輔助下，被發現時已屬肺癌中晚期。

現代醫學針對肺癌一般以手術治療、放射治療、化學藥物治療爲主，放射線治療過程中，由於射線屬殺傷性物質，對人體的傷害很大，全身反應常見神疲乏力、頭痛、眩暈、厭食、噁心嘔吐、白細胞下降等；化學藥物治療是腫瘤治療的重要手段。但化療藥物的最大的缺點是“敵我不分”，在殺滅腫瘤細胞的同時，亦會傷害機體的正常細胞，導致患者體質虛弱，免疫功能低下，生活質量下降。如化療引起的噁心嘔吐、食慾不振或厭食、腹脹、便秘或腹瀉等消化道反應，骨髓抑制導致白細胞、血小板降低、甚至出現貧血、以及肝功能異常、剝脫性皮炎、脫髮等。

這些毒副作用通過中醫藥的配合治療可以得到減輕和消除。有些中藥還有增加射線敏感性的作用，從而可以增加放療的效果。化療藥物損傷人體氣血津液、導致臟腑功能紊亂，造成嚴重的化療毒副反應是影響化療療效的最主要的原因。用中醫藥配合化療可以明顯減輕化療的副作用，增強化療效果，提高化療的完成率，對某些化療藥物還有增敏作用。同時，中醫藥通過調整機體臟腑功能，提高免疫力和抵抗力；通過扶正抗癌可延長生存期限，提高生存質量。

關鍵字：肺癌、中醫藥、放化療

## 目錄

一. 肺癌概論	頁 1
二. 肺癌中醫古文記載	頁 2
三. 現代中醫論肺癌病因病機	頁 2
1. 肺癌病因	頁 2
2. 肺癌病機	頁 2 - 頁 3
四. 肺癌分期及西醫治療原則	頁 3 - 頁 4
五. 中西醫結合在肺癌治療中的作用	頁 4 - 頁 5
六. 放化療期間中醫藥的應用	頁 5
(一)放療期間中藥的應用	頁 5
1. 中醫藥對肺癌放療增效的應用	頁 5 - 頁 6
2. 中醫藥對肺癌放療具有減毒作用	頁 6 - 頁 7
(二)化療期間中藥的應用	頁 7 - 頁 8
1. 中醫藥對肺癌化療具有增效作用	頁 8
(1) 中醫辨證施治對肺癌化療的增效作用	頁 8 - 頁 9
(2) 中藥驗方對肺癌化療的增效作用	頁 9 - 頁 10
(3) 中成藥對肺癌化療的增效作用	頁 10 - 頁 11
2. 中醫藥對肺癌化療具有減毒作用	頁 11 - 頁 12
3. 中醫藥具有明確的延長生存期的作用	頁 13 - 頁 14
4. 中醫藥可提高患者的生存質量	頁 14 - 頁 15
七. 討論與展望	頁 15 - 頁 16
八. 結語	頁 16 - 頁 17
參考文獻	頁 18 - 頁 20